

ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН С ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫМ КАНДИДОЗОМ ПРЕПАРАТОМ «МИКОСИСТ»

Сержанова Г.Г., Прокурат С.А.

Целью исследования было оценить эффективность препарата «Микосист» для лечения вульвовагинального кандидоза у женщин.

Материал и методы. Всего обследовано 20 пациенток. Из наблюдения были исключены женщины по следующим критериям: возраст младше 18 лет и старше 45 лет; беременность, лактация; антибактериальная терапия за 2 недели до исследования; отягощенный аллергоанамнез; использование химических контрацептивов; выявление гонореи, хламидиоза, герпетической инфекции; менструация, острые

инфекционные заболевания; сердечно-сосудистые заболевания с явлениями декомпенсации; заболевания почек. Препарат «Микосист» назначался по следующим схемам: больным со свежей формой кандидоза по 100 мг 1 раз в 4 дня N2; при рецидивирующей форме кандидоза по 100 мг 1 раз в 4 дня N5.

Оценка клинической и микробиологической эффективности проводилась через 10 дней и через 30 дней после окончания лечения.

Результаты. Через 10 дней после окончания лечения клиническое выздоровление и микологическая санация наблюдалась у 18 женщин (90%); у 2 женщин (10%) отмечалось повторное появление субъективных и объективных симптомов вагинального кандидоза и положительный результат микроскопического и культурального исследования вагинального отделяемого.

Через 30 дней после окончания лечения полное выздоровление наблюдалось у 16 женщин (80%), у 4 женщин наблюдался рецидив (20%).

Непереносимости препарата у обследованных пациенток не наблюдалось.

Таким образом, препарат «Микосист» позволил добиться полного выздоровления у 16 женщин (80%) и может являться препаратом выбора в лечении вульвовагинального кандидоза.